



dr n. med. Anna Okruszko  
Klinika EstMed w Białymstoku

## Modelowanie i rewitalizacja ust z zastosowaniem *STYLAGE Special Lips* z mepiwakainą – doświadczenia własne

Laboratoria Vivacy wciąż opracowuje i wprowadza na rynek udoskonalone formuły preparatów z kwasem hialuronowym. Podczas międzynarodowego kongresu IMCAS w Paryżu przedstawiono produkty *Stylage Special Lips* oraz *Stylage XXL* ze środkiem znieczulającym – mepiwakainą. W ubiegłym roku firma z powodzeniem opatentowała i wprowadziła strzykawkę w technologii *Bi-SOFT* o nowym, ergonomicznym kształcie.

Są to zmiany czyniące ogromną różnicę zarówno w komforcie wykonania zabiegu, co wpływa na precyzję ruchów i mniejsze zmęczenie ręki lekarza, jak i w bezpieczeństwie oraz minimalizacji obrzęków i wynazynień występujących po zabiegach.

Mepiwakaina należy do tej samej grupy związków znieczulających co lidokaina. Wykazuje podobną skuteczność działania i podobny profil bezpieczeństwa, porównywalny czas rozpoczęcia działania (poniżej 5 minut) oraz czas działania (ok. 1,5 godziny), a działania wazodilatacyjne są mniej nasilone. W przeprowadzonych badaniach pacjentki rozważające powiększenie ust zgłosiły, że trzema najczęstszymi powodami odstąpienia od zabiegu jest niestandardny wygląd, ból oraz siniaki i obrzęki. Firma Vivacy, skupiając się na tych trzech głównych problemach, stworzyła produkt odpowiadający potrzebom pacjentek. Przeprowadzone badania na pacjentkach, którym wykonano korektę ust, wykazały zmniejszenie obrzęku o 23%, a czas jego występowania skrócił się o połowę.

Można powiedzieć, że poziom bólu podczas wykonywania zabiegu był podobny (pacjentki zgłaszały lekkie lub umiarkowany ból, przy preparatach z lidokainą pojedyncze pacjentki zgłaszały silny ból). Efekt naturalnego wyglądu w dużej mierze uzależniony jest od precyzji wykonania, techniki pracy oraz umiejętności lekarza. Sam produkt *Stylage Special Lips* nie powoduje znacznego powiększenia objętości ust. Daje możliwość subtelnej korekty kształtu, nawilżenia oraz rozpułchnienia ust. Preparat jest lekki i miękko układa się w tkankach, nie powodując efektu szarpanego powiększenia, co jest zgodne z pożądaną naturalnością zabiegu i pozwala na szybki powrót do zdrowia.

Przedstawione poniżej efekty uzyskano przez zastosowanie 1 ml kwasu hialuronowego u pacjentek w różnym wieku. Aby uzyskać efekt widoczniejszej korekty kształtu oraz zwiększenia objętości ust, należy użyć produktu bardziej gęstego (np. *Stylage M* do zdecydowanego podkreślenia kształtu) lub większej ilości preparatu *Stylage Special Lips*.



Ryc. 1. Pacjentka lat 25, o ustach suchych, czerwień wargowej słabo napiętej. Pacjentce zależało na wywinięciu warg oraz nadaniu im regularnego kształtu. Podczas zabiegu uzyskano kształt zbliżony do litery O. Pacjentka jest osobą młodą, uniesienie kącików ust nie było konieczne. Kształt ostateczny uzyskano poprzez odbudowanie czerwień wargowej w części środkowej, napięcie konturu warg oraz odbudowanie łuku kupidyna. Kwas hialuronowy podano liniowo wzdłuż konturu ust, następnie wydatniono część środkową (poprzez podanie homogennych depozytów) i brzoży rylenki wargi górnej. Efekt widoczny na zdjęciu po zabiegowym jest efektem ostatecznym. Zabieję wykonano dwa tygodnie po zabiegu.

Ryc. 2. Pacjentka lat 35 ze znaczną asymetrią wargi górnej. Celem korekty było uzyskanie bardziej regularnego kształtu wargi górnej oraz równowagi pomiędzy wargą górną i dolną. Priorytetem było utrzymanie naturalnego kształtu ust. Do korekty wargi górnej wykorzystano 0,7 ml preparatu. Kwas hialuronowy podano wzdłuż konturu ust, a następnie prostopadle względem konturu wargi górnej w większej ilości po stronie lewej celem uniesienia czerwień wargowej. Do korekty wargi dolnej użyto 0,3 ml podając kwas hialuronowy liniowo równoległe do konturu wargi dolnej w części przyśrodkowej tworząc delikatne depozyty. Zabieję wykonano dwa tygodnie po korekcie.



Ryc. 3. Pacjentka lat 25, o drobnej twarzy. Celem zabiegu była nawilżenie, wypuklenie ust, lekkie uniesienie i zbliżenie kształtu do litery O. Wydatniono dolną wargę poprzez podanie kwasu hialuronowego zarówno prostopadle, jak i równoległe względem konturu ust. Górą wargę wywinięto w części środkowej podając preparat prostopadle do konturu ust, łuk kupidyna wydatniono poprzez podanie *Stylage Special Lips* liniowo wzdłuż brzożę wargi górnej oraz konturu ust w części środkowej. Dodatkowo podano niewielkie depozyty w obrębie czerwień wargowej, delikatnie poniżej brzożę wargi. Zmiana jest subtelna, a jednak widoczna. Pacjentka jest bardzo zadowolona z efektu. Zabieję wykonano trzy tygodnie po korekcie.

Ryc. 4. Pacjentka lat 40, usta już wcześniej powiększane w innym gabinecie, kilka lat wcześniej. Znaczną asymetrią górnej i dolnej wargi po stronie lewej. W lewą część wargi górnej i dolnej kształt prawej połowy ust. Po prawej stronie kwas hialuronowy podano równoległe do konturu ust, po lewej stronie niewielką objętość kwasu podano równoległe, liniowo w stosunku do konturu ust, a następnie prostopadle, aby uzyskać efekt wywinięcia warg po stronie prawej. Nie wzmocniono konturu ust, a efekt ten pojawił się samoczynnie w wyniku korekty. Nie powiększono objętości ust w sposób znaczący, ale nadano nową, symetryczny kształt, napięto czerwień wargową i nieco wypuklono usta. Zabieję poprzedzające wykonano miesiąc po przeprowadzonej korekcie.

**aesthetica**  
Biomedycyna dla lekarzy medycyny estetycznej i dermatologów

nr 3 (33) maj/czerwiec 2019

W numerze:

- Modelowanie i rewitalizacja ust
- Oktopiroks i ictiol w terapii łupieżowatego
- Radiofrekwencja mikroigłowa
- Leczenie łysienia plackowatego i androgenowego

**STYLAGE MEPIVACAINE**  
Kwas hialuronowy + Antyoksydanty + Anestetyki

MEPIWAKAINA MA WŁAŚCIWOŚCI WAZOKONSTRYKCYJNE

**VIVACY PARIS**

**NOWOŚĆ**  
INNOWACYJNA I OPATENTOWANA FORMUŁA!

**STYLAGE Special Lips**

**STYLAGE Special Lips**

**VIVACY PARIS**

STAN WISKOŚCICY  
WAZOKONSTRYKCYJA